

# ข้อควรทราบก่อนเข้ารับการรักษา

## ภาวะสายตาสั้นผิดปกติด้วย LASER

### 1. การหยุดรับประทานยาบางประเภท

- ยารักษาสิวชนิดรับประทานในกลุ่ม **Roaccutane, Acnotin, Isotane, Sotret** ต้องหยุดรับประทานยาก่อน และหลังการผ่าตัด อย่างน้อย **1 เดือนเต็ม** เนื่องจากยาชนิดนี้ ส่งผลให้เยื่อต่างๆ แข็งกว่าปกติ รวมถึงผิวหนังจะจกตาด้วย
- ยารักษาโรคประจำตัวบางประเภท ที่แพทย์ผู้รักษาพิจารณาแล้วให้หยุดรับประทานก่อนและหลังการผ่าตัด

### 2. การศัลยกรรมบนใบหน้า

- เสริมจมูก (Augmentation Rhinoplasty Nose Surgery) ต้องทำมาแล้วอย่างน้อย **2 เดือนเต็ม** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้ เนื่องจากในการนัดหมายแต่ละครั้ง จะมีการวัดสายตาด้วย Trial Frame ซึ่งจะกดทับจมูกของผู้เข้ารับการรักษา
- ดึงหน้า (Minimal Invasive Face Lift) ต้องทำมาแล้วอย่างน้อย **1 เดือนเต็ม** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้
- เลเซอร์หน้า ต้องทำมาแล้วอย่างน้อย **1 เดือนเต็ม** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้

### 3. การรักษาและการศัลยกรรมแก้ไขทางตา

- เลเซอร์จอบประสาทตา (Laser Retinopexy) ต้องทำมาแล้ว อย่างน้อย **2 สัปดาห์** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้
- ผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterygium Excision with Conjunctival Autograft Transplantation หรือ Pterygium Excision with Amniotic Membrane Transplantation) ต้องทำมาแล้วอย่างน้อย **2 เดือน** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้
- ผ่าตัดภาวะเยื่อตาหย่อน (Conjunctival Resection) ต้องทำมาแล้ว อย่างน้อย **2 เดือน** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้
- ทำตาสองชั้น (Blepharoplasty หรือ Double Eyelid Surgery) ต้องทำมาแล้ว อย่างน้อย **2 เดือน** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้
- ผ่าตัดแก้ไขขอบเปลือกตาที่ม้วนเข้าด้านใน (Tarsotomy หรือ Tarsectomy) ต้องทำมาแล้ว อย่างน้อย **2 เดือน** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้
- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาบนหย่อน (Upper Blepharoplasty) ต้องทำมาแล้ว อย่างน้อย **2 เดือน** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้
- ศัลยกรรมแก้ไขหนังตา (Lower Blepharoplasty) ต้องทำมาแล้ว อย่างน้อย **2 เดือน** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้
- จี้ไฟฟ้าปิดรูขนตา ต้องทำมาแล้ว อย่างน้อย **1 เดือน** จึงสามารถผ่าตัดกับ TRSC ได้

4. หากท่านกำลังรักษา หรือกำลังจะเข้ารับการรักษาเรื่องอื่นๆ ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อการผ่าตัดกับ TRSC กรุณาติดต่อสอบถามกับที่ปรึกษาประจำตัวของท่าน หรือ TRSC Call Center 02 632 4500 หรือหมายเลขฉุกเฉิน 081 174 1824, 081 174 1825



TRSC INTERNATIONAL EYE AND VISION CENTER

968 อาคารอ้อจิวเฮลซิง ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน ซี่ง 4 ซิลอม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
968 U Chu Liang Bldg 6<sup>th</sup> Fl. Rama IV Rd. Silom Bangkok Bangkok 10500

www.trscclasic.com



TRSC Call Center

+66 2 632 4500



# Preparation

## for Laser Vision Correction Surgery

### 1. Medications need to be discontinued

- **Oral acne medication such as Roaccutane, Acnotin, Isotane and Sotret** need to be discontinued before and after Laser vision Correction Surgery at least 1 month as mentioned medications contribute to severe dry eye.
- **Certain oral medications** that are instructed by a physician to be discontinued before and after Laser Vision Correction Surgery.

### 2. Facial cosmetic surgery

- **Augmentation Rhinoplasty Nose Surgery** has to be done at least 2 months before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC as a trial glasses frame for refraction may cause some heaviness on your nose.
- **Minimal Invasive Face Lift** has to be done at least 1 month before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.
- **Laser Facial Treatment** has to be done at least 1 month before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.

### 3. Optical treatment and surgery

- **Laser Retinopexy** has to be done at least 2 weeks before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.
- **Pterygium Excision with Conjunctival Autograft Transplantation or Pterygium Excision with Amniotic Membrane Transplantation** (has to be done at least 2 months before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.
- **Conjunctival Resection** has to be done at least 2 months before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.
- **Blepharoplasty or Double Eyelid Surgery** has to be done at least 2 months before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.
- **Tarsotomy or Tarsectomy** has to be done at least 2 months before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.
- **Upper Blepharoplasty** has to be done at least 2 months before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.
- **Lower Blepharoplasty** has to be done at least 2 months before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.
- **Electrolysis** has to be done at least 2 months before having Laser Vision Correction Surgery at TRSC.

**Please contact your personal counselor if you have any questions regarding above mentioned treatment/surgery or contact our call center 02 632 4500 or for an emergency, please call 08 1174 1812.**



**TRSC INTERNATIONAL EYE AND VISION CENTER**

968 อาคารอิมจีเอเคสียง ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 4 ซีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
968 U Chu Liang Bldg 6<sup>th</sup> Fl. Rama IV Rd. Silom Bangrak Bangkok 10500

[www.trscclasik.com](http://www.trscclasik.com)



TRSC Call Center

+66 2 632 4500

