วิธีการใช้ยา
สำหรับผู้เข้ารับการรักษา PRK

สำหรับผู้เข้ารับการรักษา PRK ก่อนจะทำการผ่าตัดจะต้องรับประทานวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัม ต่อวัน จนกระทั่งตรวจครบ 2 เดือนหลังผ่าตัดแล้ว

หลังผ่าตัด 1 วัน จนถึงวันที่แพทย์ตรวจและสรุปผลว่าแผลผ่าตัดปิดสนิท และแพทย์ถอดคอนแทคเลนส์

- หยอดยาปฏิชีวนะ Zymar วันละ 4 ครั้ง (เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน)
- หยอดยาแก้อักเสบ FML วันละ 1 ครั้ง (ก่อนนอน) **
- หยอดน้ำตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันเสีย อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง หรือบ่อยตามต้องการ

หลังถอดคอนแทคเลนส์

- สามารถล้างหน้า สระผมได้ตามปกติ
- หยุดหยอดยาปฏิชีวนะ Zymar
- หยอดยาแก้อักเสบ FML วันละ 4 ครั้ง (เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน) จากเดิมวันละ 1 ครั้ง ** จนพบแพทย์ครั้งต่อไป
- หยอดน้ำตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันเสีย อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง หรือบ่อยตามต้องการ
- ป้ายยา Duratears ก่อนนอน

หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์

- สุภาพสตรีสามารถแต่งตาได้ตามปกติ
- สามารถออกกำลังกาย ว่ายน้ำ ดำน้ำได้
- ลดการหยอดยาแก้อักเสบ FML จากเดิมวันละ 4 ครั้ง เหลือวันละ 3 ครั้ง (เช้า กลางวัน ก่อนนอน) ** จนพบแพทย์ครั้งต่อไป
- หยอดน้ำตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันเสีย อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง หรือบ่อยตามต้องการ
- ป้ายยา Duratears ก่อนนอน

หลังผ่าตัด 1 เดือน

- ไม่มีข้อห้ามใดๆ ยกเว้น การขยี้ตา
- ลดการหยอดยาแก้อักเสบ FML จากเดิมวันละ 3 ครั้ง เหลือวันละ 2 ครั้ง (เช้า ก่อนนอน) จนครบ 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น หยอดวันละ 1 ครั้ง (ก่อนนอน) ** จนพบแพทย์ครั้งต่อไป
- หยอดน้ำตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันเสีย อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง หรือบ่อยตามต้องการ
- ป้ายยา Duratears ก่อนนอน

หลังผ่าตัด 2 เดือน

- ไม่มีข้อห้ามใดๆ
- หยุดหยอดยาแก้อักเสบ FML
- หยุดป้ายยา Duratears
- หยอดน้ำตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันเสีย บ่อยตามต้องการ

**** ผู้เข้ารับการรักษาต้องเข้ามาพบแพทย์ทุกครั้ง ก่อนมีการปรับลดยา โดยที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านจะโทรเตือนการลดยา และหยุดยาเป็นระยะ**

TRSC INTERNATIONAL EYE AND VISION CENTER
968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 แฟ็กซ์ : 66 (0) 2 632 4431
968 U Chu Liang Bldg 6th Fl. Rama IV Rd. Silom Bangrak Bangkok 10500 Fax : 66 (0) 2 632 4431
www.trsclasik.com
TRSC Call Center 02 632 4500